

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, niveau national

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable

**n.d.** Données non disponibles  
**n.a.** Données non applicables

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance
Impact Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	45,5%	SMART	2014	●	↗
	<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	14,8%	SMART	2014	●	↗
		% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	2,7%	SMART	2014	●	↗
	<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A <sup>1</sup>	67%	WHO	1995	●	n.d.
	<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	73,4%	EDS	2012	●	↘
		% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	45,8%	EDS	2012	●	↘
<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a	
Causes Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	45,6%	Enquête Vulnérabilité	2011	○	↗
		Classement pour l'indice de la faim dans le monde	94/104	IFPRI	2015	○	↗
	<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	127	EDS	2012	○	↘
		% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	70,2%	EDS	2012	○	↘
		% de ménages ayant accès à l'eau potable	53,5%	MHA	2013	○	↗
		% de ménages qui n'ont pas de toilettes/nature	72,7%	EDS	2012	○	↗
	<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	52,9%	EDS	2012	○	↗
		% d'allaitement exclusif chez les enfants de 0 à 5 mois	23,3%	EDS	2012	○	↗
		% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	5,6%	EDS	2012	○	n.d.
		% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	34,8%	Enq. Survie de l'enfant	2009	○	n.d.
		% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	13,8%	EDS	2012	○	↗
	Causes Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	10,1%	EDS	2012	○
<b>Population</b>		Taux de fécondité par femme	7,6	EDS	2012	○	↗
		% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	12,2%	EDS	2012	○	↗
<b>Genre</b>		% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	40,4%	EDS	2012	○	↗
		Classement pour l'indice d'inégalité de genre	154/155	PNUD	2014	○	↘
<b>Pauvreté</b>		% de la population vivant sous le seuil national de pauvreté	48,9%	Banque Mondiale	2011	○	n.d.

<sup>1</sup> Donnée trop ancienne datant de 1995: WHO Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk.

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, niveau national

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Rural	Sévérité	Urbain	Sévérité	Source	Année	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	52,1%	<span style="color: yellow;">●</span>	32,4%	<span style="color: red;">●</span>	SMART	2014
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	15,8%	<span style="color: red;">●</span>	12,8%	<span style="color: red;">●</span>	SMART	2014
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	3,1%	<span style="color: red;">●</span>	1,9%	<span style="color: red;">●</span>	SMART	2014
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	73,9%	<span style="color: red;">●</span>	69,8%	<span style="color: red;">●</span>	EDS	2012
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	46,5%	<span style="color: red;">●</span>	42,4%	<span style="color: red;">●</span>	EDS	2012
<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	163	○	83	○	EDS	2012
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	72,9%	○	58,1%	○	EDS	2012
			% de ménages ayant accès à l'eau potable	49%	○	74%	○	MHA	2013
			% de ménages qui n'ont pas de toilettes/nature	83,4%	○	13,7%	○	EDS	2012
	<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	50%	○	71,8%	○	EDS	2012	
		% d'allaitement exclusif chez les enfants de 0 à 5 mois <sup>1</sup>	9,1%	○	14,5%	○	Enq. Survie de l'enfant	2009	
		% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	3,9%	○	15,6%	○	EDS	2012	
		% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	32,7%	○	35,6%	○	Enq. Survie de l'enfant	2010	
		% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	11,5%	○	25,4%	○	EDS	2012	
Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	4,4%	○	34,8%	○	EDS	2012	
	<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	8,1	○	5,6	○	EDS	2012	
		% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	9,7%	○	27%	○	EDS	2012	
	<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	47,1%	○	17,2%	○	EDS	2012	
	<b>Pauvreté</b>	% de la population vivant sous le seuil national de pauvreté	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Banque Mondiale	2011	

<sup>1</sup> Une donnée plus récente (2012) existe pour le niveau national mais cette donnée n'est pas désagrégée par zone de résidence.

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région d'Agadez

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	28,2%	SMART	2014	<span style="color: yellow;">●</span>	↘
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	14,4%	SMART	2014	<span style="color: red;">●</span>	↗
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	2,6%	SMART	2014	<span style="color: red;">●</span>	↗
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	76,7%	EDS	2012	<span style="color: red;">●</span>	↗
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	50%	EDS	2012	<span style="color: red;">●</span>	↘
		<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	n.d	n.d	n.d	○	n.d
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	51	EDS	2012	○	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	69,8%	EDS	2012	○	↗
			% de ménages ayant accès à l'eau potable	54%	MHA	2013	○	↗
		<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	70,7%	EDS	2012	○	↗
			% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	13,8%	EDS	2012	○	n.d
			% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	36%	Enq Survie de l'enfant	2009	○	n.d
% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	14,2%	EDS	2012	○	↗			
Causes	Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	23%	EDS	2012	○	↗
		<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	5,7	EDS	2012	○	↘
			% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	17,8%	EDS	2012	○	↗
		<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	25,6%	EDS	2012	○	↗

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Diffa

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	42%	SMART	2014	<span style="color: red;">●</span>	↗
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	13,8%	SMART	2014	<span style="color: red;">●</span>	↗
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	1,8%	SMART	2014	<span style="color: yellow;">●</span>	↘
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	87,9%	EDS	2012	<span style="color: red;">●</span>	↗
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	17,1%	EDS	2012	<span style="color: yellow;">●</span>	↗
		<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	59,4%	Enq Vulnérabilité	2011	○	↗
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	41	EDS	2012	○	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	76,3	EDS	2012	○	↗
		<b>Soins</b>	% de ménages ayant accès à l'eau potable	46%	MHA	2013	○	↗
			% d'initiation précoce de l'allaitement	83%	EDS	2012	○	↗
			% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	8,4%	EDS	2012	○	n.d
			% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	10,6%	Enq Survie de l'enfant	2009	○	n.d
	% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	11,9%	EDS	2012	○	↗		
Causes	Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	6,6%	EDS	2012	○	↗
		<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	6,4	EDS	2012	○	↗
			% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	11,5%	EDS	2012	○	↗
		<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	43,1%	EDS	2012	○	↘

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Dosso

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	31,5%	SMART	2014	●	↗
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	14,2%	SMART	2014	●	↗
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	2,4%	SMART	2014	●	↘
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	75,4%	EDS	2012	●	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	58,1%	EDS	2012	●	↗
		<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	43,6%	Enq Vulnérabilité	2011	○	↗
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	190	EDS	2012	○	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	58%	EDS	2012	○	↘
			% de ménages ayant accès à l'eau potable	62%	MHA	2013	○	↗
	<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	57,1%	EDS	2012	○	↗	
		% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	3,4%	EDS	2012	○	n.d	
		% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	52,3%	Enq Survie de l'enfant	2009	○	n.d	
		% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	16,2%	EDS	2012	○	↗	
Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	8,5%	EDS	2012	○	↗	
	<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	7,5	EDS	2012	○	↗	
		% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	18%	EDS	2012	○	↗	
	<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	33%	EDS	2012	○	↗	

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Maradi

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	55,9%	SMART	2014	●	↗
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	15,7%	SMART	2014	●	↘
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	3,4%	SMART	2014	●	↗
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	68,7%	EDS	2012	●	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	42,7%	EDS	2012	●	↘
		<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	39,9%	Enq Vulnérabilité	2011	○	↗
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	166	EDS	2012	○	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	74,8%	EDS	2012	○	↘
			% de ménages ayant accès à l'eau potable	49%	MHA	2013	○	↗
		<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	40,7%	EDS	2012	○	↗
			% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	3,7%	EDS	2012	○	n.d
			% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	23,7%	Enq Survie de l'enfant	2009	○	n.d
	% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	11,3%	EDS	2012	○	↗		
Causes	Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	6,4%	EDS	2012	○	↗
		<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	8,4	EDS	2012	○	↘
			% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	6,9%	EDS	2012	○	↗
		<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	43,6%	EDS	2012	○	↘

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Niamey

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance
Impact Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	24%	SMART	2014	<span style="color: yellow;">●</span>	↗
	<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	12,8%	SMART	2014	<span style="color: red;">●</span>	↗
		% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	1,4%	SMART	2014	<span style="color: yellow;">●</span>	↗
	<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d.	n.d.	n.d.	○	n.d.
	<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	78,5%	EDS	2012	<span style="color: red;">●</span>	↗
		% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	47,4%	EDS	2012	<span style="color: red;">●</span>	↗
	<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a
Causes Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	31,2%	Enq. Vulnérabilité	2011	○	↗
	<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	80	EDS	2012	○	↘
		% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	67%	EDS	2012	○	↗
		% de ménages ayant accès à l'eau potable	49%	MHA	2013	○	↗
	<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	64,3%	EDS	2012	○	↗
		% d'allaitement exclusif chez les enfants de 0 à 5 mois	7%	EDS	2012	○	
		% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	16,8%	EDS	2012	○	n.d.
		% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	56,4%	Enq. Survie de l'enfant	2009	○	n.d.
	% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	28,4%	EDS	2012	○	↗	
Causes Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	40,9%	EDS	2012	○	↗
	<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	5,3	EDS	2012	○	→
		% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	31,8%	EDS	2012	○	↗
	<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	15%	EDS	2012	○	↗

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Tahoua

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	37,2%	SMART	2014	●	↘
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	14,7%	SMART	2014	●	↗
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	2,2%	SMART	2014	●	↘
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	73,6%	EDS	2012	●	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	40,5%	EDS	2012	●	↘
<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a		
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	44,4%	Enq Vulnérabilité	2011	○	↗
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	140	EDS	2012	○	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	68%	EDS	2012	○	↘
			% de ménages ayant accès à l'eau potable	44%	MHA	2013	○	↗
		<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	50,2%	EDS	2012	○	↗
			% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	5,4%	EDS	2012	○	n.d
			% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	38,1%	Enq Survie de l'enfant	2009	○	n.d
	% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	8,1%	EDS	2012	○	↗		
Causes	Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	4,9%	EDS	2012	○	↗
		<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	7,3	EDS	2012	○	↗
			% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	5,8%	EDS	2012	○	↗
		<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	46,4%	EDS	2012	○	↗



# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Tillabéry

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance
Impact Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	38,5%	SMART	2014	●	↘
	<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	13,4%	SMART	2014	●	↗
		% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	2,8%	SMART	2014	●	↘
	<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
	<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	70,1%	EDS	2012	●	↘
		% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	46,4%	EDS	2012	●	↗
	<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a
Causes Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	46,4%	Enq. Vulnérabilité	2011	○	↗
	<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	168	EDS	2012	○	↘
		% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	68,7%	EDS	2012	○	↘
		% de ménages ayant accès à l'eau potable	50%	MHA	2013	○	↗
	<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	45,1%	EDS	2012	○	↗
		% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	9,9%	EDS	2012	○	n.d
		% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	55,1%	Enq. Survie de l'enfant	2009	○	n.d
	% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	20,8%	EDS	2012	○	↗	
Causes Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	7,8%	EDS	2012	○	↗
	<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	7,9	EDS	2012	○	↗
		% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	11,7%	EDS	2012	○	↗
	<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	37,5%	EDS	2012	○	↗

# Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Zinder

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

		Indicateurs	Statut	Source	Année	Sévérité	Tendance	
Impact	Nutritionnel	<b>Malnutrition chronique</b>	% de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois	48,3%	SMART	2014	●	↗
		<b>Malnutrition aigue</b>	% de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois	14,8%	SMART	2014	●	↗
			% de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois	1,9%	SMART	2014	●	↘
		<b>Carence en vitamine A</b>	% des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A	n.d	n.d	n.d	○	n.d.
		<b>Carence en fer</b>	% des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie	76,3%	EDS	2012	●	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie	50,3%	EDS	2012	●	↘
<b>Carence en iode</b>	Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans	n/a	n/a	n/a	○	n/a		
Causes	Sous-jacentes	<b>Sécurité alimentaire</b>	% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire	50,2%	Enq. Vulnérabilité	2011	○	↗
		<b>Santé et assainissement</b>	Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)	160	EDS	2012	○	↘
			% des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé	77,1%	EDS	2012	○	↘
			% de ménages ayant accès à l'eau potable	63,4%	MHA	2013	○	↗
		<b>Soins</b>	% d'initiation précoce de l'allaitement	63,4%	EDS	2012	○	↗
			% des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE	2,5%	EDS	2012	○	n.d
			% des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs	13,5%	Enq. Survie de l'enfant	2009	○	n.d
	% de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII	12,6%	EDS	2012	○	↗		
Causes	Fondamentales	<b>Education</b>	% de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus	8,4%	EDS	2012	○	↗
		<b>Population</b>	Taux de fécondité par femme	8,5	EDS	2012	○	↗
			% de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne	16%	EDS	2012	○	↗
		<b>Genre</b>	% des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative	52,3%	EDS	2012	○	↗